



DZIEŃ DAWCY SZPIKU W GÓRZE

1 GRUDNIA 2013r, niedziela




10:00 – 16:00

POSIR Hala ARKADIA

ul. Szkolna 2a



*„Z radością oddam
Ci Klaro część
swoich kropek ☺”*



Droga Mamo! Drogi Tato!

Czy wiesz, że możesz uratować komuś życie?
Proszę, przyłącz się do walki z białaczką!
Przyjdź zarejestruj się jako dawca szpiku
żeby dołączyć do bazy
potencjalnych dawców szpiku kostnego.
Wystarczy tak niewiele od siebie,
żeby tak wiele zrobić dla innych!
To naprawdę ważne. Bo życie jest tylko jedno!

Rejestracja jako potencjalny dawca to przeprowadzenie wstępnego wywiadu medycznego, wypełnienie formularza i pobranie wymazu z wewnętrznej strony policzka, który jest niezbędny do określenia cech zgodności antygenowej. Faktycznym dawcą zostaniesz, gdy okaże się, że posiadasz takie same cechy zgodności antygenowej, jak chory pacjent.

Chory na białaczkę dostaje szansę na nowe życie, kiedy dochodzi do przeszczepu komórek macierzystych od zgodnego genetycznie, niespokrewnionego dawcy. Istnieją dwa sposoby pobrania komórek macierzystych.

- I. Pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej – w Polsce stosowane w ok. 80% pobrań do przeszczepów
 - Dawca otrzymuje przez okres 5 dni wytwarzaną w organizmie substancję zbliżoną do hormonów (czynnik wzrostu). Lek ten pobudza produkcję komórek macierzystych w szpiku kostnym, które specjalną metodą można następnie pobrać bezpośrednio z krwi.
 - Metoda ta znana jest na świecie od 1988 roku. Według obecnego stanu badań ryzyko wystąpienia odległych w czasie skutków ubocznych jest nieznane.
 - Podczas zażywania leku mogą wystąpić grypopodobne symptomy.
 - Nie ma konieczności pobytu w szpitalu.
 - Zabieg pobrania komórek z krwi obwodowej trwa około 3-4 godzin.
- II. Pobranie szpiku kostnego
 - Szpik pobiera się z talerza kości biodrowej (nie jest to rdzeń kręgowy). Od znajdującego się pod narkozą dawcy pobiera się ok. 5% szpiku kostnego i podaje pacjentowi.
 - Dawca przyjmowany jest na oddział zwykle dzień przed pobraniem szpiku. W szpitalu pozostaje 2-3 dni.
 - Po pobraniu szpiku dawca może przez kilka dni odczuwać lokalny ból, podobny jak przy słućzeniach.
 - Szpik kostny dawcy ulega kompletnej regeneracji w przeciągu 2 tygodni.